

RIKTLINJE

RUTIN

Rutin vid konstaterad smitta hos anhörig som sammanbor med kund/patient

Framtagen av: Eva-Karin Stenberg, MAS	Gäller from: 2021-05-06	Gemensam med Regionen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Gäller egen regi: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Process hänvisning:
Godkänd av:	Gäller tom: Tillsvidare		Gäller privat regi: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Uppdaterad av:	Uppdateringsdatum:		Gäller intraprenad: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Innehåll

Inledning.....	1
Symtom	1
Vid misstänkt/konstaterad covid-19 smitta hos anhörig	1
Hemtjänst med kommunal hemsjukvård.....	1

Inledning

Coronavirus är ett luftvägsvirus som vanligtvis orsakar förkylning. I nuläget är det endast provtagning som kan skilja luftvägsinfektioner åt. Liksom andra luftvägsvirus sprids det via droppsmitta och kontaktsmitta.

Symtom

Symtombilden innefattar allt från mild luftvägsinfektion, ofta med hosta, med eller utan feber, till svåra luftvägsbesvär i form av lunginflammation. Symtom som allmän sjukdomskänsla, nedsatt lukt och smak, muskelvärk, huvudvärk och mag-tarmbesvär förekommer också.

Vid misstänkt/konstaterad covid-19 smitta hos anhörig

- Hemtjänstpersonal frågar den anhörige om hen varit hos läkare och fått en medicinsk bedömning av sina symtom. Uppmana till kontakt med sjukvården för bedömning och provtagning.
- Vid behov kan ansvarig enhetschef ta samtalet med den anhörige.
- Enhetschef dokumenterar i kundens huvudbild i Magna Cura att anhörig har misstänkt eller konstaterad covid-19.
 - Hemtjänstpersonal ber anhörig meddela samordnare när hen är symtomfri.
 - Smittfrihet uppnås vid 48 h symtomfrihet samt minst 7 dagar i okomplicerat normalfall.
 - Var mycket uppmärksam på eventuella förkylningssymtom som uppstår under inkubationstiden (2-14 dagar) hos kunden.
 - Be den anhörige att om möjligt vara i ett annat rum när stöd och hjälp ges till kund.
 - Skyddsutrustning (visir, andningsskydd eller munskydd, kort eller långärmad rock/förkläde) sätts på direkt. Handskar används vid risk för kontakt med kroppsvätskor.
 - Som en extra försiktighetsåtgärd vid misstänkt/eller konstaterad covidsmitta ska personal under de första sju dagarna från symtomdebut ersätta munskyddet mot andningsskydd vid patientnära arbete (<2 meter) vid vårdkontakt > 15 minuter.

Hemtjänst med kommunal hemsjukvård

- Informera ansvarig chef och sjuksköterska om att det finns misstänkt/konstaterad covid-19 smittad anhörig
- Sjuksköterska samtalar med den anhörige om behovet av medicinsk bedömning och eventuell provtagning.
- Följ för övrigt rutinerna ovan.

- Sjuksköterska dokumenterar i kundens huvudbild i Magna Cura att anhörig har misstänkt eller konstaterad covid-19.